



Casa di Cura "Città di Aprilia" s.r.l.

Via Delle Palme, 25 - 04011 Aprilia (LT) - Centralino 06.92707958 - Fax 06.92061268

Servizio accettazione e prenotazioni: 06.92704125 - 06.9271825

www.casadicuracittadiapriliasrl.it

Accreditata con il S.S.R. DRG n° U00357 del 30/10/2014

Preparazione (in anestesia generale):

Cosa è necessario fare per poter eseguire l'esame

- Emocromo, GOT, GPT, Azotemia, Glicemia, Creatinina, Sodio, Potassio, Calcio, PT, PTT, INR
- Elettrocardiogramma refertato
- La settimana che precede l'esame far visionare gli esami e l'elenco dei farmaci regolarmente assunti all'anestesista del servizio presso l'ambulatorio di endoscopia il mercoledì dalle ore 09.00 alle 11.00

Se si stanno assumendo farmaci

Potete continuare ad assumere l'abituale terapia. Fanno eccezione farmaci antiaggreganti (ad es. cardioaspirina, cardirene, aspirinetta, tiklid, plavix etc.) e/o anticoagulanti (ad es. coumadin, sintrom, etc). Se fate uso di questi farmaci è necessario consultare il proprio medico di base e/o lo specialista cardiologo per concordare la sospensione o modificare lo schema terapeutico.

Nei pazienti in terapia con anticoagulanti si raccomanda di eseguire, il giorno che precede l'esame, il controllo dell'INR che non deve superare il valore di 1,5.

Sospendere 15 giorni prima dell'esame i farmaci gastroprotettori.

Dieta da seguire

Nei 4-5 giorni che precedono l'esame seguire una dieta priva di scorie (evitando frutta, verdura e legumi).

Il giorno prima dell'esame si raccomanda un pranzo leggero (pasta in brodo, petto di pollo o pesce lesso, yogurt magro) e una cena liquida con brodo senza pastina.

La mattina dell'esame è consentita una colazione con the o caffè zuccherato solo nel caso in cui l'esame è previsto nel pomeriggio.

E' necessario il digiuno nelle 5 ore che precedono l'esame (astenersi anche dall'assumere liquidi).

Preparazione con MOVIPREP

Il farmaco è CONTROINDICATO nei pazienti affetti da FAVISMO (per la presenza di acido ascorbico) e/o affetti da FENILCHETONURIA (per la presenza di aspartame).

La preparazione intestinale prevede l'assunzione di 2 litri di MOVIPREP. Ogni litro e' costituito da una busta A e una B che vanno sciolte insieme in 1 litro d'acqua. La soluzione ricostituita va bevuta nell'arco di 1-2 ore.

Raramente durante la preparazione possono manifestarsi disturbi come nausea e lievi dolori addominali.

In caso di vomito ripetuto e forti dolori addominali consulti il proprio medico o il centro di endoscopia.

PER ESAME DA ESEGUIRE IN MATTINATA

- 1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere tra le 16:00 e le 17:00 del giorno che precede l'esame seguito da 1/2 litro di LIQUIDO CHIARO (acqua, the o camomilla)
- 1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere tra le 19:00 e le 20:00 del giorno che precede l'esame seguito da 1/2 litro di LIQUIDO CHIARO (acqua, the o camomilla)

PER ESAME DA ESEGUIRE NEL POMERIGGIO

- 1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere tra le 17:00 e le 18:00 del giorno che precede l'esame seguito da 1 litro di LIQUIDO CHIARO (acqua, the o camomilla)
- 1 litro di MOVIPREP (busta A+B) da assumere la mattina stessa dell'esame tra le 7:00 e le 9:00 seguito da 1 litro di LIQUIDO CHIARO (acqua, the o camomilla)

**PRESENTARSI MUNITI DI TAMPONE COVID-19 ESEGUITO
MAX 2 GIORNI PRIMA DELL'ESAME**